Meldepflichtige Mücken- und Zeckenübertragene Infektionen beim Menschen in Deutschland

Christina Frank, PhD, Robert Koch-Institut
13.05.2022, BVÖGd, Magdeburg

Einleitung

Leben ist Veränderung...

- Neue Vektoren
- Neue Viren
- Klimawandel
- Alternde Gesellschaft
- Trend zu mehr Fernreisen
- Sich veränderndes Freizeitverhalten
- Veränderte Anforderungen an den ÖGD

Jahresdurchschnittstemperaturen in Deutschland im Beobachtungszeitraum 1881 bis 2020, dargestellt als Anomalien vom Bezugszeitraum (1971 bis 2000), basierend auf HYRAS-TAS. Blaue Balken sind negative Anomalien und rote Balken positive Anomalien. Die schwarze Linie zeigt den vieljährigen Mittelwert (1971 bis 2000), die gestrichelte Linie den linearen Trend.
Quelle: www.DWD.de/zeitreihen

Mittelwerte der Änderungssignale für ausgewählte Klimaparameter für ganz Deutschland für die Mitte des Jahrhunderts (2031 bis 2060) im Vergleich zum Bezugszeitraum (1971 bis 2000), RCP8.5

	Bezugszeitraum (Mittelwerte)	15. Perzentil	85. Perzentil
Jahresmittel Lufttemperatur	8,6 °C	+1,5 °C	+2,2 °C
Mittlere Lufttemperatur im Sommer	16,6 °C	+1,4 °C	+2,3 °C
Mittlere Lufttemperatur im Winter	0,8 °C	+1,3 °C	+2,5 °C
Anzahl der Hitzetage pro Jahr	4,6 d	+4,6 d	+10,3 d
Anzahl der Tropennächte pro Jahr	0,1 d	+0,8 d	+2,7 d
Mittlerer Jahresniederschlag	774 mm	-1%	+10%
Mittlerer Niederschlag im Frühjahr	176 mm	+3%	+15%
Mittlerer Niederschlag im Sommer	231 mm	-10%	+9%
Mittlerer Niederschlag im Herbst	188 mm	-7%	+10%
Mittlerer Niederschlag im Winter	181 mm	+2%	+19%
Anzahl Niederschlagstage > 20mm	4,4 d	+0,3 d	+1,6 d
Anzahl Trockentage	236,1 d	-3 d	+11,9 d

Datengrundlage: Deutscher Wetterdienst

Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland,
<https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/KWRA-Zusammenfassung>

Was ist mücken-/zeckenübertragen und meldepflichtig?

- §6 IfSG (1) 1. g) virusbedingtes hämorrhagisches Fieber, z.B.
 - CCHF (Krim-Kongo-Hämorrhagisches Fieber)
 - Gelbfieber
- §7 IfSG (1)...
 - 6a. Chikungunyavirus
 - 10. Coxiella burnetii (Q-Fieber)
 - 10a. Dengue-Virus
 - 14. Francisella tularensis (Tularämie)
 - 15. FSME-Virus
 - 16. Gelbfiebertivirus
 - 48a. West-Nil-Virus
 - 50. Zika-Virus **und sonstige Arboviren**
- §7 IfSG (3): Plasmodium sp. (Malaria)
- §6 (1) 5.: Sonstige „bedrohliche übertragbare Krankheit“
- §7(2): Sonstige Krankheitserreger als „schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit“
- Versch. Landesverordnungen:
 - Lyme-Borreliose (BE, BB, BY, SN, TH, MV, RP, SL),
 - Meningitis/Enzephalitis (SN, ST, TH)
 - Alle Rückfallfieber (SN)

Beispiele

- FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)
- Lyme-Borreliose
- CCHF (Krim-Kongo-hämorrhagisches Fieber-Virus)

- Chikungunya/Dengue/Zika-Fieber etc (Erreger übertragbar durch *Ae. albopictus*)
- West-Nil-Fieber

Erreger und Vektor endemisch

Lyme-Borreliose

- Meldepflicht: nur nach Landesverordnungen
- Häufigste zeckenübertragene Infektion in Europa
- Um 1% der Menschen mit Zeckenstich erkranken
- Starke regionale Unterschiede, Sommer-Saison
- Hauptvektor in DE: *Ixodes ricinus*
- Wildtiere als Reservoir
- Ca. 10% der Erkrankten mehr als nur *Erythema migrans*
- Kein Impfstoff
- Prävention ruht auf persönlichem Schutz, frühzeitiger Zeckenentfernung

FSME-Risikogebiete in Deutschland

ROBERT KOCH INSTITUT

Basis: FSME-Erkrankungen in den Jahren 2002–2021,
die dem RKI übermitteln wurden, n = 6.442; Stand: 21.01.2022

Ein Kreis wird als FSME-Risikogebiet definiert, wenn die Anzahl der übermittelten FSME-Erkrankungen in mindestens einem der 16 Fünfjahreszeiträume im Zeitraum 2002–2021 im Kreis ODER in der Kreisregion (bestehend aus dem betreffenden Kreis plus allen angrenzenden Kreisen) signifikant ($p < 0,05$) höher liegt als die bei einer Inzidenz von 1 Erkrankung pro 100.000 Einwohner erwartete Fallzahl.

Kreise, die im Jahr 2022 zum Risikogebiet ausgewiesen werden: SK Chemnitz, LK Görlitz, LK Oberspreewald-Lausitz, LK Oder-Spree, LK Spree-Neiße, SK Söllingen

Kein Risikogebiet
Kreise, die in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen keine Risikogebiete sind: Baden-Württemberg: SK Heilbronn; Bayern: SK Augsburg, LK Fürstentumbruck, SK München, SK Schweinfurt; Sachsen: SK Leipzig, LK Nordsachsen

Erreger und Vektor endemisch

FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)

- Meldepflicht: §7(1) IfSG
- Hauptvektor in DE: *Ixodes ricinus*; Reservoir: Wildtiere
- Endemiegebiet in Süddeutschland mit Tendenz zur Ausdehnung nach Norden
- Saison: rund um den Sommer; 400-750 Fälle/Jahr
- Biphasischer Krankheitsverlauf: zunächst grippeähnlich, später neurologische Manifestationen (besonders schwer bei Erwachsenen), ca. 1% letal, bis 95% asymptomatisch
- Impfpräventabel
- Prävention: Repellentien, Absammeln von Zecken
- ÖGD: Diagnosen sichern
 - in neu-betroffenen Gebieten
 - bei geimpften Meldefällen

Einsendeschien KL:

www.rki.de/fsme-einsendeschien

Nicht-endemischer Erreger

Ausblick? CCHFV (Krim-Kongo hämorrhagisches Fieber Virus), übertragen durch Hyalomma-Zecken *Invasive Art*

- Meldepflicht: §6 (VHF) und §7 (1) IfSG
- Welt: Großes Endemiegebiet
- Mensch i.d.R. durch Zeckenstich infiziert
- nosokomiale Übertragbarkeit
- Klinisch als VHF teilweise schwerwiegend/tödlich
- 2009 zwei reiseassoz. Fälle in DE gemeldet

<https://www.who.int/images/default-source/health-topics/crimean-congo-haemorrhagic-fever/global-cchfrisk-2017.png>

Ausblick? CCHFV (Krim-Kongo hämorrhagisches Fieber Virus), übertragen durch Hyalomma-Zecken - Fortsetzung

<https://www.zepak-rki.de/atlas/>

- Vektoren: *Hyalomma*-Zecken, werden zunehmend in Deutschland identifiziert
- Zugvögel können Zecken/Virus z.B. aus Afrika mitbringen

Nicht-endemische Erreger Chikungunya-, Dengue-, Zikavirus etc, übertragbar durch *Ae. albopictus* *Invasive Art*

- Krankheitslast-Aspekte: Bei Zika-Virus teratogene Wirkung in der Schwangerschaft, bei Dengue seltene sehr schwere Verläufe
- Infektionseintrag über reiseassoziierte Infektionen
- Regional in Deutschland zunehmend geeignete Vektoren (*Ae. albopictus*) vorhanden, können sich bundesweit ausbreiten
- Klimarelevanz: Längere wärmere Sommer verlängern theoretische Saison, verkürzen intrinsische Inkubationszeit (schnellere Fallgenerationsfolge)
- Theoretische Eignung lokaler Vektoren bei hiesigen Temperaturen vor allem für Chikungunya klar, weniger geeignet für Dengue & Zika
- Mittelmeerraum: Große Chikungunya-Ausbrüche, aber bei Dengue & Zika bislang nur kleine Fall-Cluster

Neues Virus

West-Nil-Virus (WNV)

(Haupt-)Vektor endemisch

- Vektoren: vor allem *Culex*, Vögel = Amplifikationswirte
- Mensch Fehlwirt, ca. 1% der Infizierten entwickelt neuroinvasives Krankheitsbild mit ca. 10% Letalität, vor allem Ältere, Vorerkrankte
- Virus seit mindestens 2018 in Deutschland, bislang nur in Zentral-Ostdeutschland, Ausbreitung möglich
- Ab 2018: 1-22 Infektionen/Jahr gemeldet und bestätigt

West-Nil-Virus (WNV) - Fortsetzung

- Labordiagnose beim Menschen schwierig (Serologie und sogar PCR-Tests z.T. unspezifisch, Bestätigungstestung erforderlich). Diagnostiziert werden fast nur schwer erkrankte Fälle und Blutspender
- Nachweise in Tieren beschreiben das Endemiegebiet VOR Auftreten menschlicher Fälle
- Keine Impfung verfügbar.

Autochthone WNV-Fälle 2019-2021 mit bekanntem Symptombeginn

Präventionsansätze durch den ÖGD – Stechmücken – *Ae. albopictus*

- Invasive Art! Neue Populationen lassen sich ggf. noch bekämpfen
 - z.B. KABS
 - Bevölkerung beteiligen, Brutplatz-Reduktion, Populations-Reduktion mit Larviziden möglich
- Wo vorkommend, mindestens Juli-September:
 - zügige Ermittlungen rund um Meldefälle DENV, CHIKV, ZIKV etc., um ggf. autochthone Übertragung zu erkennen
 - rund um gemeldete reiseassoziierte Infektionen mit Chikungunya-, Dengue-, Zikavirus:
 - Mückenschutz vor allem für Patienten (damit Mücken das Virus nicht aufnehmen können)
 - Ggf. *Ae. albopictus*-Bekämpfung im Aufenthalts-Umfeld
 - Syndromische Wachsamkeit für das Auftreten von autochthonen Folgefällen
 - Virämie besteht bei symptomatisch und asymptomatisch Infizierten. Dauer: wenige Tage, Timing: rund um Erkrankungsbeginn. **PCR-Tests als Virämie-Indikator nicht sinnvoll.** Von Virämie in Deutschland ist auszugehen, wenn Symptombeginn in Deutschland oder in letzten Tagen vor Einreise nach Deutschland.
- Weitere Ausbreitung ist zu vermuten

Präventionsansätze durch den ÖGD – Stechmücken – *WNV-Culex*

- Zur Situationseinschätzung, beachten Sie
 - WNV-Nachweise bei
 - Mücken (selten vorhanden)
 - Vögeln und Pferden (TSIS* / FLI)
 - Menschen, inkl. Blutspendern
 - Die Saison (Übertragung endet vermutlich ca. September)
- Wo vorkommend:
 - Brutplatzreduktion im Wohnumfeld, z.B. in Gärten Einsatz von Larviziden, (Bekämpfung adulter Mücken vermutlich nur bei großem Ausbruch sinnvoll/machbar)
 - Machen sie auf WNV als in Deutschland neue Erkrankung aufmerksam
 - Ärzteschaft, um Diagnosen zu erleichtern
 - WNV-Risikogruppen (Senioren, Vorerkrankte), Aufklärung über Risiken und mögliche persönliche Schutzmaßnahmen
- (Reiseassoziierte menschliche Fälle spielen keine Rolle für die autochthone Situation)

- In Vorjahren und im aktuellen Jahr
- In Nachbarkreisen und eigenem Kreis

*TSIS WNV-Abfrage: https://www.tsis.fli.de/Reports/Info_SO.aspx?ts=416&guid=98ad4329-22bb-441c-a888-dc35a3482e6c

Präventionsansätze durch den ÖGD - Zecken

- Heimische Zecken:
 - Vektorbekämpfung kaum möglich
 - Aufklärung über Risiken und persönliche Schutzmaßnahmen,
 - FSME: Impfung
 - ggf. lokale Hinweise auf besonders zeckenbelastete Gebiete, Infektions-Foci
- *Hyalomma* und andere invasive Zecken:
Dokumentation der Situation (z.B.
Zeckenatlas: <https://www.zepak-rki.de/>)

Zusammenfassung

- Relevanz vektorübertragener Infektionen durch Klimawandel verändert, vermutlich vergrößert
- Für eine Situationseinschätzung in Ihrer Region, nutzen sie vorhandene Informationsquellen zum Vorkommen von
 - Erregern (vor allem bez. WNV, FSME)
 - Vektoren (aktuell vor allem *Ae. albopictus*)
- Saisonales Problem (vor allem Sommer)
 - Meldefälle Arboviren: Schnell abklären, ob ggf. autochthon
 - Bestätigungsdiagnostik bei autochthonen WNV-Meldungen und ‚atypischen‘ FSME-Meldungen (außerhalb Endemiegebiet, FSME-geimpft)
 - Vektoren: Nehmen Sie die Bevölkerung mit (z.B. Mücken-Brutplatzbeseitigung, Warnschilder in Gebieten mit hoher Zeckendichte etc.)

Vielen Dank!