Pestizide im Urin von Vorschulkindern – Möglichkeiten der gesundheitlichen Beurteilung

Dr. Martin Kraft

Fachbereich Umweltmedizin, Toxikologie, Epidemiologie, Noxen-Informationssystem

Es bestehen keine Interessenskonflikte

Hintergrund Pestizide

- ca. 50.000 Tonnen Pestizide werden pro Jahr in Deutschland eingesetzt
- Kontrolluntersuchungen zeigen, dass
 - 73% aller Kernobstproben aus konventioneller Produktion Rückstände
 - 50% aller Obst- und Gemüseproben Mehrfachrückstände von bis zu 12 verschiedenen Wirkstoffen aufweisen
- Gesetzliche Rückstandshöchstgehalte werden bei der Überwachung nur in Ausnahmefällen überschritten
- Zu den wichtigsten in Deutschland eingesetzten Wirkstoffgruppen zählen
 - Organophosphat-Insektizide
 - Pyrethroide
 - Neonicotinoide
 - Glyphosat

Metabolismus

- Die meisten Pestizide werden im menschlichen Körper relativ schnell metabolisiert, z.B. Chlorpyrifos (HWZ: 10-16 h)
- Die Bestimmung der menschlichen Pestizid-Belastung erfolgt über Human-Biomonitoring-Untersuchungen durch Erfassung der Metaboliten in Urinproben
- Die meisten derzeitigen Pestizid-Metaboliten sind unspezifische Biomarker, d.h. sie zeigen die Belastungen mit unterschiedlichen Ausgangsprodukten an

Fragestellungen und Methode

- Wie hoch ist die Belastung von Kita-Kindern aus Nordrhein-Westfalen mit Organophosphat-Insektiziden, Pyrethroiden, Neonicotinoiden und Glyphosat?
- Ist eine gesundheitliche Beurteilung der Pestizid-Belastungen möglich?
- Untersuchung des Urins von 95 Kita-Kindern auf 8 Metaboliten von Organophosphat-Insektiziden, 8 Metaboliten von Pyrethroiden, 4 Metaboliten von Neonicotinoiden und Glyphosat
- Berechnung der täglichen Aufnahme (Daily Intake) für Pestizide mit einem spezifischen Biomarker im Vergleich zum ADI (Acceptable Daily Intake)

Abkz.	Metabolit	Ausgangsprodukt
CIF3CA	3-(2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropan-carbonsäure	Cyhalothrin, Bifenthrin
cis-DCCA	3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropan-carbonsäure	Permethrin, Cypermethrin
trans-DCCA	3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropan-carbonsäure	Permethrin, Cypermethrin
CPBA	4-chlor-isopropylbenzyllessigsäure	Esfenvalerat
DBCA *	cis-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyclopropan-carbonsäure (spez.)	Deltamethrin
F-PBA	4-fluor-3-phenoxybenzoesäure	Cyfluthrin
3-PBA	3-phenoxybenzoesäure	Permethrin, Cypermethrin
2-MPB	2-methyl-3-phenylbenzoesäure	Bifenthrin
3-CT-5-CA	3-Chlorthiazol-5-carbonsäure	Clothianidin, Thiamethoxam
6-C-NA	6-Chlor-nicotinsäure	Acetamiprid, Imidacloprid, Thiacloprid, Nitrenpam
2-C-NA	2-Chlor-nicotinsäure	Boscalid
4-TFM-NA *	4-(Trifluormethyl)-nicotinsäure (spez.)	Flonicamid
DMP	Dimethylphosphat	Bomyl, Crooxyphos, Dichlorvos, Naled
DEP	Diethylphosphat	Chlorfenvinphos, Parathion, TEPP
DMTP	Dimethylthiophosphat	Chlorpyrifos-methyl, Pirimiphos-methyl
DMDTP	Dimethyldithiophosphat	Azinphos-methyl, Malathion, Phosmet
DETP	Diethylthiophosphat	Chlorpyrifos, Parathion, Pirimiphos-ethyl, Azinphos-ethyl, Dialifos, Disulfoton, Ethion
DEDTP	Diethyldithiophosphat	
TCPY *	Trichlorpyridinol (spez.)	Chlorpyrifos
4-NP	4-Nitrophenol	Parathion, Paraoxon
Gly	(Glyphosat)	Glyphosat

Anthropometrische Daten

Quelle: fotolia/AfricaStudio

Anzahl Studienteilnehmer/innen	n = 95
Geschlecht	50 ♂, 45 ♀
Alter: Min – Max (Median) [Monate]	42 – 78 (61)
Größe: (Median) [cm]	100 – 128 (112)
Gewicht: (Median) [kg]	14 – 29 (19)
BMI: (Median) [kg/m²]	11 – 21 (15)

Belastung mit Pyrethroid-, Neonicotinoid- und Organophosphat-Pestizid-Metaboliten sowie Glyphosat im Urin (n = 95), Kita-Studie 2014/2015

Kenndaten Chlorpyrifos und Deltamethrin

■ Chlorpyrifos

- ADI: 0,001 mg/kg KG x d, Endpunkt: Acetylcholinesterase-Hemmer
- Metabolit: 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol (TCPy), spezifischer Marker, 70 % der Ausgangssubstanz Chlorpyrifos (DFG 2004)
- HWZ: 10-16 h (ATSDR 1997), orale Resorption bis zu 90 % (ATSDR 1997)
- Molekulargewicht Chlorpyrifos: u = 350 Gramm pro Mol
- Molekulargewicht TCPY: u = 198 Gramm pro Mol

■ Deltamethrin

- ADI: 0,01 mg/kg KG x d, Endpunkt: Neurotoxizität, Nervenleitung-Blockade
- Metabolit: cis-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarbonsäure (DBCA), spezifischer Marker 25% der Ausgangssubstanz Deltamethrin (Aylward et al. 2011)
- HWZ: 7-16 h (ATSDR 2003), orale Resorption 30 % (Aylward et al. 2011)
- Molekulargewicht Deltamethrin: u = 505 Gramm pro Mol
- Molekulargewicht DBCA: u = 298 Gramm pro Mol

Vorschlag für die Berechnung von systemischer Expositionsdosis (SED) und täglicher Aufnahme (DI) nach Fromme et al.

$$SED = (K_U \times UV_{norm} / F_{UE}) \times (MW_a / MW_m)$$

- SED: systemische Expositionsdosis [$\mu\text{g}/\text{kg bw} \times \text{d}$]
- K_U : Konzentration des Metaboliten in Urin [$\mu\text{g}/\text{l}$]
- UV_{norm} : Urinvolumen, 3-6jährige Kinder [$\text{l}/\text{kg bw} \times \text{d}$]
- F_{UE} : Fraktion des ausgeschiedenen Metaboliten in Relation zu seiner Ausgangssubstanz
- MW_a und MW_m : Molekulargewicht der Ausgangssubstanz und seines Metaboliten [g/mol]

Chlorpyrifos

$$SED = \frac{x \frac{\mu\text{g}}{\text{L}} \times 0,03 \frac{\text{L}}{\text{kg bw} \times \text{d}}}{0,7} \times \frac{351 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{198 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}$$

Deltamethrin

$$SED = \frac{x \frac{\mu\text{g}}{\text{L}} \times 0,03 \frac{\text{L}}{\text{kg bw} \times \text{d}}}{0,25} \times \frac{505 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{298 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}$$

Glyphosat

$$SED = x \frac{\mu\text{g}}{\text{L}} \times 0,03 \frac{\text{L}}{\text{kg bw} \times \text{d}}$$

$$DI = (SED \times 100 / Res_{oral})$$

- DI: Berechnete tägliche Aufnahme [$\mu\text{g}/\text{kg bw} \times \text{d}$]
- Res_{oral} : orale Resorption [%]

Berechnete tägliche Aufnahme (DI) von Chlorpyrifos, Deltamethrin und Glyphosat im Vergleich zur akzeptablen täglichen Aufnahme (ADI) (Vorschlag, endgültige Prüfung durch HBM-Kommission)

Fazit

- Die untersuchten Kinder weisen eine große Bandbreite an Belastungen mit Pestiziden auf
- Die höchsten Werte im Urin werden für Organophosphat-Insektizide gemessen, gefolgt von Pyrethroiden, Neonicotinoiden sowie Glyphosat
- Eine gesundheitliche Bewertung der gemessenen Belastungen ist nur auf Grundlage spezifischer Metaboliten oder der Ausgangssubstanz (sofern keine Metabolisierung) möglich
- Für Glyphosat und Deltamethrin liegt die berechnete tägliche Aufnahme (DI) bei allen Kindern unterhalb des ADI
- Bei rund 5% der Kinder könnte der ADI für Chlorpyrifos überschritten sein, Überprüfung und Bewertung durch Human-Biomonitoring-Kommission

*Wir bedanken uns bei allen Kindern und ihren Eltern
für die Teilnahme an der Studie!*

Besonderer Dank an Prof. Thomas Göen (UNI Erlangen), Dr. Thomas Schettgen (RWTH Aachen) und Dr. Hans-Werner Hoppe (Bremen) für die chemischen Analysen sowie an Dr. Yvonne Chovolou (LANUV) und Jennifer Engelmann (LANUV) für ihre unterstützenden Arbeiten!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Quelle: fotolia/EvgeniiAnd

Diese Studie wurde
vom Ministerium für
Umwelt,
Landwirtschaft,
Natur- und
Verbraucherschutz
des Landes
Nordrhein-Westfalen
finanziert